

## PRINCIPIOS SOBRE LA GLUCOSA EN SANGRE:

## CONSEJOS PARA OBTENER UNA LECTURA EXITOSA

Con algunos medidores, puede usar su **antebrazo**, **muslo** o **parte carnosa de su mano** en lugar de la yema del dedo.

Si usa la yema del dedo, pinche el lado de la yema del dedo junto a la uña para evitar que le queden dolorida la yema del dedo, que es con la parte que más toca las cosas.

Los dispositivos de punción con resorte pueden hacer que el pinchazo sea menos doloroso.

Los objetos punzantes usados (lancetas y agujas) son desechos peligrosos y no deben arrojarse directamente en la basura; si no se desechan de forma segura, pueden causar cortes o infecciones a otras personas. Proteja a su comunidad y deseche siempre los objetos punzantes usados en un recipiente específico.

Los recipientes para objetos punzantes gratuitos pueden estar disponibles a través de su médico, hospital, seguro de salud o donde obtenga su medicamento. También puede comprar uno en la farmacia o en línea. Si tiene algo en su casa, como un recipiente de plástico vacío y resistente, también puede usarlo siempre que esté en posición vertical y tenga una tapa hermética que no se pueda perforar y no gotee. Por ejemplo, una botella de detergente vacía o una lata de café podrían funcionar.